



BELUGA

SISTEMIČNI FUNGICID SA PROTEKTIVNIM, KURATIVNIM I ERADIKATIVNIM DELOVANJEM NA BAZI PROTIKONAZOLA

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU I PRATEĆE UPUTSTVO. PRIDRŽAVATI SE UPUTSTVA ZA UPOTREBU DA BI SE IZBEGLI RIZICI PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU.

U promet se stavlja u obliku koncentrovane suspenzije – SC .

Sastav preparata:

Aktivna supstanca: ————— Protiokonazol

Generički naziv: ————— Protiokonazol

Hemijski naziv (IUPAC): ————— (RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

Sadržaj: ————— 480±24g/l Protiokonazol

Tehnička čistoća: ————— min.97%

CAS br: ————— 178928-70-6

FRAC

Protiokonazol 3 (G1)



UPUTSTVO I USLOVI ZA PRIMENU:

Beluga je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje fuzarioze klasa (*Fusarium spp.*) u usevu pšenice. Preparat se primenjuje folijarno, traktorskim prskalicama sa zemlje, u dozi 0,35–0,40 l/ha, u fenofazi od 59 do 65 BBCH skale (početak do punog cvetanja).

Za optimalan efekat, tretman je potrebno obaviti preventivno ili pri prvim znacima infekcije, uz obavezno kvalitetno pokrivanje klasova radnom tečnošću. Maksimalno je dozvoljeno dva tretiranja u toku jedne vegetacije na istoj parceli.

Primenjuje se u usevu pšenice za suzbijanje paleži klasa (*Fusarium spp.*).

Način delovanja: Inhibitor demetilacije sterola (biosinteza ergosterola).

BEZBEDNI VREMENSKI PERIODI: Od faze 59 – 65 BBCH skale.

NAČIN PRIMENE: Folijarno, traktorskim prskalicama sa zemlje.

Tretiranje iz vazduhoplova: Nije dozvoljeno

MOGUĆNOST MEŠANJA SREDSTVA: Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja, ali pre mešanja proveriti njihovu kompatibilnost. Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije.

Upotreba sredstva za zaštitu bilja dozvoljen je isključivo sertifikovanim profesionalnim korisnicima

FITOTOKSIČNOST: Ukoliko se upotrebi u skladu sa uputstvom za upotrebu, ispitivani preparat ne izaziva pojavu fitotoksičnih efekata u usevu pšenice.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i žetve): 35 dana.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju ili zaštićenom prostoru): 6 časova.

OSTALA OGRANIČENJA: Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorista voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Uticao na vodene organizme (toksičnost):

Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Sprečiti dospevanje preparata u vode (vodotoci, jezera, bunari, izvorista voda i vodosnabdevanja) i kanalizacionu mrežu.

Zone bezbednosti u odnosu na površinske vode:

Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoci, jezera, bunari, izvorista voda i vodo snabdevanja), drenažnih sistema, otvorenih vodovodnih sistema ili mesta gde je moguće slivanje kiše sa tretiranih površina u vodotokove, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Ne tretirati tokom toplog i vetovitog vremena. Zabranjeno zagađivanje voda i kanalizacije preparatom ili ambalažom.

Maksimalan broj tretiranja u toku vegetacije na istoj površini: 2 puta

PRIPREMA SREDSTVA ZA PRIMENU: Potrebnu količinu preparate sipati u rezervoar prskalice, predhodno do polovine napunjen vodom, zatim dopuniti rezervoar vodom i dobro promešati.

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROMUČKATI BOCU.

ROK UPOTREBE: 2 godine ako se pravilno skladišti.

DATUM PROIZVODNJE I BROJ ŠARŽE UTISNUT NA AMBALAŽI.

Broj rešenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

002973635 2024 14842 003 000 321 009 od 02.09.2025.

Proizvodi i pakuje: Hemijska Industrija ŽUPA d.o.o., Kruševac Srbija, Sandora Petefija bb, tel: 037/424-476, e-mail: office@hizupa.rs

Zastupnik i distributer za Bosnu i Hercegovinu:

NOVOPROM d.o.o. Modriča, Majevička 4, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, tel: +387 53 820-681

REŠENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE:

12.03.3-330-3395/25 od 01.12.2025.



1L