



# Blauvit



**BAKAR HIDROKSID**  
770 g/kg

## POSTUPAK ČIŠĆENJA UREĐAJA ZA PRIMENU:

Ostatke sredstva za prskanje razrediti vodom u odnosu 1: 10 l i primeniti na tretiranu površinu dok je uključena mešalica. Dobro isprati rezervoar prskalice i isprazniti cevi prskalice i dizne, čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Očistiti dizne i filtere. Ceo sistem isprati čistom vodom. Prskalice i dizne treba isprati napolu, na mestima gde sredstvo ne može dospeti u površinske vode i gde nema opasnosti za ljude i životinje.

## MOGUĆNOST MEŠANJA SREDSTVA (kompatibilnost):

Može se mešati sa sumporom uz uslov da reakcija mešavine ostane neutralna i sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije.

## NEMOGUĆNOST MEŠANJA SREDSTVA

(nekompatibilnost-nemogućnost mešanja):

Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat) i kalcijum polisulfidom.

## FITOTOKSIČNOST:

Preparat ne izaziva fitotoksične efekte, ako se primenjuje u skladu sa uputstvom proizvođača.



## OPASNOST

### OBAVEŠTENJE O OPASNOSTI:

**H302** Štetno ako se proguta  
**H330** Smrtonosno ako se udiše  
**H318** Dovodi do teškog oštećenja oka  
**H410** Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

**EUH401** Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

**Obaveštenja o merama predostrožnosti:** Nositi opremu za zaštitu respiratornih organa. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odevu/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. **AKO DOSPE U OČI:** Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. **AKO SE UDIŠE:** Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. Hitno pozvati centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. Skladištiti pod ključem. Odlaganje sadržaja /ambalaže/ vršiti u skladu sa propisima RS.

### OPŠTE OZNAKE BEZBEDNOSTI:

**SP 1** – Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom

### POSEBNE DODATNE OZNAKE BEZBEDNOSTI ZA KORISNIKE:

**SPo2** – Posle primene sredstva za zaštitu bilja oprati zaštitnu odevu

### Broj rešenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

321-01-1697/2018-11 od 18.03.2019.god. sa svim važećim dopunama i izmenama.



Datum proizvodnje i broj šarže: odštampan na foliji

Rok upotrebe: 5 godina ako se pravilno skladišti

## BLAUVIT

### NESISTEMIČNI FUNGICID I BAKTERICID SA PREVENTIVNIM DELOVANJEM

Nalazi se na listi registrovanih sredstava za zaštitu bilja koja se mogu koristiti u ORGANSKOJ PROIZVODNJI.

**PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA  
OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU I PRATEĆE  
UPUTSTVO. PRIDRŽAVATI SE UPUTSTVA ZA  
UPOTREBU DA BI SE IZBEGLI RIZICI PO ZDRAVLJE  
LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU**

U promet se stavlja  
u obliku kvašljivog praška WP, plave boje.

### SASTAV PREPARATA

Aktivna supstanca: bakar-hidroksid

Generički naziv: bakar (II) hidroksid

Hemijski naziv (IUPAC): bakar (II) hidroksid

Sadržaj: **500 ±25 g/kg bakra** (770 g/kg bakar-hidroksida;

min. 58% Bakra, što odgovara 89% bakar-hidroksida)

CAS br: 20427-59-2

### PRIMENA

**BLAUVIT** se koristi u zasadima **vinove loze** za suzbijanje prouzrokovala plamenjače (*Plasmopara viticola*) u koncentraciji od 0,35–0,4% (35–40 g na 10 l vode) i **šećerne repe** za suzbijanje pegavosti lista (*Cercospora beticola*) u koncentraciji od 2 kg/ha (20 g na 100 m<sup>2</sup>). Preparat se primenjuje preventivno u feno fazama 11-79 BBCH skale za vinovu lozu i 39-49 BBCH za šećernu repu, u zavisnosti od potrebe.

### MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA:

**Vinova loza:** Dva tretiranja na istoj površini u toku jedne godine. **Šećerna repa:** Četiri tretiranja na istoj površini u toku jedne godine.

### UTROŠAK VODE:

600 – 1000 l/ha (6-10 l na 100 m<sup>2</sup>) za vinovu lozu  
i 400 l/ha (4 l na 100 m<sup>2</sup>) za šećernu repu.

### KARENCA

(vreme između poslednje primene preparata pre berbe):

14 dana za **šećernu repu**, 21 dan za **stone sorte**  
i 28 dana za **vinske sorte**.

### RADNA KARENCA

(vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru):

Do sušenja depozita.

### PRIPREMA SREDSTVA ZA PRIMENU I NAČIN PRIMENE:

Odmerenu količinu preparata treba prethodno izmešati sa malo vode, a zatim uz stalno mešanje preneti u rezervoar u kome se nalazi preostala količina vode. Primena se može obaviti svim standardnim uređajima za tretiranje sa zemlje.

### NAPOMENE

Ne prskati pri brzini vetra većoj od 2-3 m /s.

Štetno za ptice i kišnu glistu.

Štetno za pčele.

Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada!  
**TRETIRANJE IZ VAZDUHOPLOVA: NIJE DOZVOLJENO**

Proizvodi i pakuje

 **ZUPA** H.I. Župa DOO  
Kruševac / Srbija / Šandora Petefija bb  
☎ 037 424 476 ✉ office@hizupa.rs

netto  
1 kg