

OPASNOST

Obaveštenje o opasnosti: Štetno ako se proguta. Štetno ako se udiše. Dovodi do teškog oštećenja oka. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Dodatno obaveštenje o opasnosti:

EUH401 „Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.“

EUH208 „Sadrži 1,2-benzizotiazolin-3-on. Može da izazove alergijsku reakciju.“

Obaveštenje o merama predostrožnosti: Izbegavati udisanje magle/para. Oprati ruke i lice detaljno nakon rukovanja. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pazljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode. Sakupiti prosuti sadržaj. Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

Dodatne oznake bezbednosti: SP 1 Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom. Uređaje za primenu sredstva za zaštitu bilja ne čiti u blizini površinskih voda. Sprečiti zagađenje odvodnih kanala sa poljoprivrednih površina i puteva.

SPo2 Pose primene sredstva za zaštitu bilja oprati zaštitnu odeću

SPe3 Zbog zaštite vodenih organizama treba poštovati zone bezbednosti od 20 m od vodene površine

Simptome trovanja i mere prve pomoći i lečenja: Preparat nakon ingestije može dati sledeće opšte simptome: muka, gađenje, malaksalost, glavobolja, a nekada i povraćanje. Pri udisanju može dati suv nadražajni kašalj i osećaj stezanja u grudima. Kontakt sa očima dovodi do bola, crvenila konjunktiva, suzenja, pečenja u oku, a moguća su i teža oštećenja oka. Udisanje: Ako se nakon udisanja isparenja preparata pojave tegobe, izneti eksponiranu osobu na čist vazduh, a nakon toga potražiti savet lekara. Kontakt sa kožom: Nakon kontaminacije kože neophodno je odmah skinuti eventualno kontaminiranu odeću i kožu obilno oprati vodom. Odmah se obratiti lekaru. Kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe treba oprati. Kontakt sa očima: Ako preparat dospe u oči neophodno je obilno ispiranje vodom u trajanju od 15-tak minuta (uz otvorene očne kapke), a nakon toga se obratiti lekaru. Gutanje: Ako je preparat progutan popiti jednu do dve čaše vode. Ne izazivati povraćanje. Ukoliko je osoba bez svesti ne davati joj ništa. Odmah se obratiti lekaru. Pri obraćanju lekaru obavezno pomeni nalepnicu sa nazivom i/ili sastavom preparata. Za detaljne informacije i prijavu trovanja (ekspozicije) obratiti se u Centar za kontrolu trovanja, Vojnomedicinska akademija, Crnotravska 17, 11000 Beograd svakog dana od 0-24 h na telefone: 36-08-440, 662-381, 2661-122 lok. 31-440, 26-146.

Način ispiranja ambalaže: Ispranjenju ambalažu od sredstva za zaštitu bilja potrebno je isprati odmah nakon praznjenja, kako se sredstvo za zaštitu bilja ne bi osušilo u unutrašnjosti ambalaže. Tečnost od ispiranja (isprlak) ambalaže sipa se u rezervoar uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i koristi za pripremanje rastvora za tretiranje. Ispranjenju ambalaža ispira se korišćenjem postupka trostrukog ispiranja ili postupka ispiranja pod pritiskom. Postupak trostrukog ispiranja vrši se na sledeći način: sadržaj ambalaže se isprazni u rezervoar prskalice i ostavi da se oceci 30 sekundi; doda se voda do 1/3 zapremine ambalaže; ambalaža se zatvori i sadržaj snažno promućka, tako da voda dođe do svih unutrašnjih površina; zatvarač ambalaže se skine i pusti se da voda kojom je izvršeno ispiranje iscure u rezervoar uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i ambalaža se ostavi 30 sekundi da se oceci. Postupak se ponovi još dva puta i svaki put pri ponavljanju postupka ispiranja koristi čista voda, a zatim se isprana ambalaža probuši na tri mesta i tako učini neupotrebljivom. Ispranje ispranjenju ambalaže postupkom pod pritiskom vrši se korišćenjem specijalnog rasprskivača koji se nalazi na uređajima za primenu sredstava za zaštitu bilja i vrši se na sledeći način: dno ili bočni zid ambalaže se probuši i na to mesto se pričvrsti specijalni rasprskivač - dizna uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja; kroz specijalni rasprskivač - diznu propušta se voda u trajanju od oko 30 sekundi; po završenom ispiranju, ambalaža se ostavlja da se oceci i osuši, probuši se na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.



Blauvit Ultra SC

Nesistemični fungicid sa preventivnim delovanjem

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU I PRATEĆE UPUTSTVO.

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROMUČKATI BOCU. PRIDRŽAVATI SE UPUTSTVA ZA UPOTREBU DA BI SE IZBEGLI RIZICI PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU.

U promet se stavlja u obliku koncentrovane suspenzije - SC.

Sastav preparata:

Aktivna supstanca: ————— Bakar hidroksid
Generički naziv: ————— Bakar hidroksid
Hemijski naziv (IUPAC): ————— bakar (II) hidroksid
Sadržaj: ————— 240,0±14,4 g/l bakra (Cu)
iz bakar-hidroksida (368,4 g/l bakar-hidroksida;
min. 58% bakra što odgovara 89% bakar-hidroksida)
CAS br: ————— 20427-59-2

FRAC

Neorganska jedinjenja bakra M1

Postupak čišćenja uređaja za primenu: Potpuno isprazniti rezervoar uređaja za primenu na tretiranju površini; Rezervoar napuniti vodom i isprazniti čitav sistem. Rastaviti i očistiti disne, filtere i ostalo. Uređaj za primenu treba očistiti i isprati na površini na kojoj je tretman izvršen, dalje od izvora voda (bunari, jezera, vodotoci, izвориšta voda).

Postupanje sa ostacima SZB i ispraznjenom ambalažom: Nakon upotrebe, korisnik sredstva za zaštitu bilja ne sme ponovo koristiti ispraznjenu ambalažu u bilo koje svrhe, već se prazna ambalaža mora zbrinuti na propisan način. Ostaci pesticida se uklanjaju sa ambalaže do nivoa 0,1% kako bi se ambalaža učinila neopasnom. Korisnik SZB ispranu ambalažu odlaze u posebne kese i dostavlja distributeru od koga je sredstvo kupljeno.

Uputstvo o postupanju u slučajevima ispuštanja sredstva za zaštitu bilja u životnu sredinu: Ne prosipati u vodotokove i stajale vode. Praznu ambalažu takođe ne bacati u vodotokove, kanalizaciju i deponije da ne bi došlo do zagađenja životne sredine. U slučaju prosipanja supstancu, na najpogodniji način, sakupiti i odložiti na za to određeno i na adekvatan način obezbeđeno mesto (kontejneri). Praznu ambalažu, takođe, odložiti na za to određeno mesto.

Uputstvo za pravilno skladištenje: Preparat treba skladištiti u originalnoj ambalaži, na suvom, hladnom i dobro ventiliranom mestu, na sobnoj temperaturi, daleko od direktne sunčeve svetlosti. Čuvati pod ključem u dobro zatvorenim kontejnerima. Pri tome treba izbegavati kontakt sa jakim kiselinama, bazama i oksidirajućim agensima. Čuvati van dohvata dece, odvojeno od hrane, pića, stočne hrane i predmeta opšte upotrebe.

PRIMENA: Blauvit Ultra SC se koristi u sledećim zasadima: Vinove loze za suzbijanje prouzrokovala plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,3-0,4% (30-40 ml u 10l vode); Maline za suzbijanje prouzrokovala sušenja lastara (Didymella appianata) u koncentraciji 0,4 % (40 ml u 10l vode); Paradajza za suzbijanje prouzrokovala plamenjače (Phytophthora infestans) u koncentraciji 0,3-0,4% (30-40 ml u 10l vode).

Vreme primene: Vinova loza: tretmani tokom faze intezivnog porasta, cvetanja i razvoja bobica (BBCH 15-79); Malina: tretmani tokom faze intezivnog rasta izbojaka; Paradajz: preventivni tretmani tokom faze intezivnog rasta, cvetanja i formiranja plodova (BBCH 19-79);

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: Najviše 4 tretiranja na istoj površini u toku jedne godine.

Način primene i utrošak vode: Vinova loza: folijarno, uz utrošak vode od 600-1000l/ha; Malina: folijarno, uz utrošak vode od 300-600l/ha; Paradajz: folijarno, uz utrošak vode od 400-600l/ha;

Tretiranje iz vazduhoplova: Nije dozvoljeno. **Upotreba sredstva za zaštitu bilja dozvoljen je isključivo sertifikovanim profesionalnim korisnicima.**

MOGUĆNOST MEŠANJA SREDSTVA: Sredstvo se može mešati sa sredstvima na bazi sumpora za tretiranje vinove loze, uz uslov da pH mešavine ostane neutralan. Ne može se mešati sa sredstvima izrazito bazne reakcije, insektidima koji kisele reakcije, sa sredstvima na bazi kalcijum-polisulfida, kao ni sa drugim formulacijama.

FITOTOKSIČNOST: Ukoliko se sredstvo za zaštitu bilja koristi u preporučenim koncentracijama primene i u skladu sa uputstvom proizvođača, nema opasnosti od pojave fitotoksičnosti. Sredstvo može biti fitotoksično ukoliko se primeni u uslovima hladnog i vlažnog vremena ili nakon dozvoljenog perioda primene.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe): Vinova loza – 28 dana; malina – OVP; paradajz – 7 dana;

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru): **jedan dan.**

NAPOMENA: Pošto je skladištenje i primena van našeg uticaja, ne snosimo rizik nepravilnog skladištenja i primene.


ROK UPOTREBE: 2 godine ako se pravilno skladišti
DATUM PROIZVODNJE I BROJ ŠARŽE UTISNUT NA AMBALAŽI.

Broj rešenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 321-01-1642/2022-11 od 15.11.2022. sa svim važećim dopunama i izmenama.

Proizvodi i pakuje: Hemijska Industrija ZUPA d.o.o., Kruševac Srbija, Sadržaj Petefija bb, tel: 037/424-476, e-mail: office@hizupa.rs

ZASTUPNIK I DISTRIBUTER ZA BOSNU I HERCEGOVINU: NOVOPROM d.o.o. Modriča, Majevička 4, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, tel: +387 53 820-681

RJESENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE: 12.03.3-330-4227/23 od 10.01.2024.



1L