



OPASNOST

Obaveštenje o opasnosti: Zapaljiva tečnost i para. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Štetno ako se proguta. Štetno u kontaktu sa kožom. Izaзива iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Dodatna obaveštenja o opasnosti: EUH401 „Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.“

Obaveštenje o merama predostrožnosti: Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabrano pušenje. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara/. Ne izazivati povraćanje. Sakupiti prosuti sadržaj. Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom. Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima

Dodatne oznake bezbednosti: SP 1 Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom. Uređaje za primenu sredstva za zaštitu bilja ne čistiti u blizini površinskih voda/Sprečiti zagađenje odvodnih kanala sa poljoprivrednih površina i puteva. SPo2 Posle primene sredstva za zaštitu bilja oprati zaštitnu odeću. SPe8 Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usev za vreme cvetanja/Ne primenjivati u vreme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu u toku primene i 48h nakon primene/Ne primenjivati u vreme cvetanja korova/Odstraniti korove pre cvetanja/Ne primenjivati sredstvo za zaštitu bilja pre završetka dnevnog leta pčela, već ga primeniti tek nakon završetka dnevnog leta pčela, kasno uveče.

Simptomi trovanja i mere prve pomoći i lečenja: Muka, gadjenje, malaksalost, glavobolja, a nekad i povraćanje. Izaзива crvenilo i svrab kože i iritaciju sluznice očiju i digestivnog trakta,. Manifestuje se crvenilom konjunktivita i suženjem oka, a u grlu i u stomaku bol. U slučaju udisanja treba skloniti izloženu osobu sa mesta ekspozicije na čist vazduh. U slučaju kontakta sa kožom, odmah skinuti kontaminiranu odeću i oprati kožu vodom. Pokazati bezbednosni list ili etiketu osobi koja pruža prvu pomoć i lekaru. U slučaju trovanja za bližu uputstva o lečenju kontaktirati Centar za kontrolu trovanja

Uputstvo za pravilno skladištenje: Skladištiti u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Sredstvo držati dobro zatvoreno, u originalnoj ambalaži, na suvom hladnom i dobro provetrenom mestu Čuvati van domašaja dece. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

Ne sme se mešati sa: preparatima alkalne reakcije i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola ili drugih alkohola.

Način ispiranja ambalaže: Ispranjenju ambalažu od sredstva za zaštitu bilja potrebno je ispirati odmah nakon praznjenja, kako se sredstvo za zaštitu bilja ne bi osušilo u unutrašnjosti ambalaže. Tečnost od ispiranja (ispirak) ambalaže sipa se u rezervoar uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i koristi za pripremanje rastvora za tretiranje. Ispranjena ambalaža ispira se korišćenjem postupka trostrukog ispiranja ili postupka ispiranja pod pritiskom. Postupak trostrukog ispiranja vrši se na sledeći način: sadržaj ambalaže se isprazni u rezervoar prskalice i ostavi da se oceđi 30 sekundi; dođe se voda do 1/3 zapremine ambalaže; ambalaža se zatvori i sadržaj snažno promućka, tako da voda dođe do svih unutrašnjih površina; zatvarač ambalaže se skine i pusti se da voda kojom je izvršeno ispiranje iscuri u rezervoar uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i ambalaža se ostavi 30 sekundi da se oceđi. Postupak se ponovi još dva puta i svaki put pri ponavljanju postupka ispiranja koristi čista voda, a zatim se isprana ambalaža probuši na tri mesta i tako učini neupotrebljivom. Ispiranje ispranjene ambalaže postupkom pod pritiskom vrši se korišćenjem specijalnog raspršivača koji se nalazi na uređajima za primenu sredstava za zaštitu bilja i vrši se na sledeći način: dno ili bočni zid ambalaže se probuši i na to mesto se pričvrsti specijalni raspršivač - dizna uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja; kroz specijalni raspršivač - diznu propušta se voda u trajanju od oko 30 sekundi; po završenom ispiranju, ambalaža se ostavlja da se oceđi i osuši, probuši se na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Postupanje sa ostacima SZB i ispranjenom ambalažom: Nakon upotrebe, korisnik sredstva za zaštitu bilja ne sme ponovo koristiti ispranjenju ambalažu u bilo koje svrhe, već se prazna ambalaža mora zbrinuti na propisan način. Ostaci pesticida se uklanjaju sa ambalaže do nivoa 0,1% kako bi se ambalaža učinila neopasnom. Korisnik SZB ispranu ambalažu odlaze u posebne kesе i dostavlja distributeru od koga je sredstvo kupljeno.

Uputstvo o postupanju u slučajevima ispuštanja sredstva za zaštitu bilja u životnu sredinu: Sprečiti oticanje ili prosipanje sredstva. Ako je došlo do prosipanja pokupite sa nezapaljivim apsorbujućim materijalom (npr. peskom, zemljom, infuzorijskom zemljom, vermikulitom) i odložiti u kontejnere namenjene za ovakvu vrstu otpada, u skladu sa propisima.



TAJFUN

NESISTEMIČNI INSEKTICID SA KONTAKTNIM I DIGESTIVNIM DELOVANJEM

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU I PRATEĆE UPUTSTVO
PRIDRŽAVATI SE UPUTSTVA ZA UPOTREBU DA BI SE IZBEGLI RIZICI PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU

TAJFUN se u promet stavlja u obliku koncentrata za emulziju EC.

Sastav PREPARATA:

Aktivna supstanca: ————— CIPERMETRIN
Generički naziv: ————— CIPERMETRIN
Hemijski naziv (IUPAC): ————— (RS)-α-cijano-3-fenoksiben-
zil(1RS)-cis-trans-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat

Sadržaj: ————— 200± 12g/l
Tehničke čistoće: ————— min. 94%
CAS br: ————— 52315-07-8

Rastvarač : —————
Generički naziv : ————— SHELSOL-A
Sadržaj: ————— oko 690g/l

IRAC

Cipermetrin

3A

Postupak čišćenja uređaja za primenu: Potpuno isprazniti rezervoar uređaja za primenu na tretiranoj površini; Rezervoar napuniti vodom i isprazniti čitav sistem. Rastaviti i očistiti dizne, filtere i ostalo. Uređaj za primenu treba očistiti i isprati na površini na kojoj je tretman izvršen, dalje od izvora voda (bunari, jezera, vodotoci, izвориšta voda).

Napomena: Pošto je skladištenje i primena van našeg uticaja, ne snosimo rizik nepravilnog skladištenja i primene.

PRIMENA:

TAJFUN je nesistemičan insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Primenjuje za suzbijanje prve ili druge generacije sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u zasadu vinove loze, u koncentraciji 0,015 - 0,03% (1,5 - 3ml u 10l vode). Vreme primene je 7-8 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopakama ili na početku piljenja prvih gusenica.

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: jedan put u toku godine na istoj površini.

Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6 - 10l na 100m²).

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe): Vinovna loza 56 dana

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru): Jedan dan

Toleranca - MDK (maksimalno dozvoljena količina ostataka pesticida): Cipermerin 0,5 mg/kg za grožđe

Razgradnja pesticida: (poluvreme razgradnje u prirodnim uslovima za cipermetrin): u zemljištu DT₅₀ 8-16 dana, u vodi DT₅₀ 4-5 dana.

Rezidualno delovanje: 10-12 dana

Napomena: ne sme se primenjivati u vreme leta pčela. Upotreba sredstva za zaštitu bilja dozvoljen je isključivo sertifikovanim profesionalnim korisnicima.

Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno

PRIPREMA SREDSTVA ZA PRIMENU I NAČIN PRIMENE:

Određenu količinu preparata sipati u rezervoar koji je do pola napunjen vodom, a zatim uz stalno mešanje dopuniti rezervoar vodom. Primena se može obaviti svim standardnim uređajima za tretiranje sa zemlje.

Mešanje sa drugim pesticidima:

Može se mešati sa preparatima na bazi: malationa, hlorpirifosa, hlorpirifos-metila, cimazola.

Ne sme se mešati sa alkalnim preparatima i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola ili drugih alkohola.

Negativno delovanje preparata:

FITOTOKSIČNOST:

(A) - Toksično po pčele. Sredstvo za zaštitu bilja se ne sme primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada.

(B) - Na vodenu životnu sredinu:

Na organizme u vodi (otrovnost) : Veoma toksično po vodene organizme. Može prouzrokovati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.

- Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda tretirajući najmanje 20m udaljeno od njih.

ROK UPOTREBE: 4 godine od datuma proizvodnje ukoliko se pravilno skladišti.

DATUM PROIZVODNJE I BROJ ŠARŽE: odštampan na boci

Broj rešenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 321-01-2398/2018-11 od 01.07.2025. sa svim važećim dopunama i izmenama.

ZASTUPNIK I DISTRIBUTER ZA BOSNU I HERCEGOVINU:

NOVOPROM d.o.o. Modriča, Majevička 4, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, tel: +387 53 820-681

RJEŠENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE: 12.03.3-330-4043/24 od 20.11.2024.

Proizvodi i pakuje:

H.I. "Župa" d.o.o., Kruševac, Srbija, Šandora Petefija bb, tel: 037/424-476, office@hizupa.rs



1L