



PAŽNJA
Obaveštenja o opasnosti: Štetno ako se proguta. Može dovesti do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
Dodatna obaveštenja o opasnosti:
EUH401 „Pridrživati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.“
EUH208 „Sadrži 2,2,2“- (heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil) trietanol. Može da izazove alergijsku reakciju.“

Obaveštenja o merama predostrožnosti: Ne udisati prašinu / maglu / paru . Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Potražiti medicinski savet/ posmatranje, ako se ne osećate dobro. AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara/ ako se osećate loše. Sakupiti prosuti sadržaj. Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima

Dodatne oznake bezbednosti:
SP1 Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom. Uredaje za primenu sredstava za zaštitu bilja ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti zagađivanje odvodnih kanala sa poljoprivrednih površina i puteva.

SPo2 Posle primene sredstva za zaštitu bilja oprati zaštitnu odeću
SPe3 Zbog zaštite vodenih organizama, neciljanog bilja i neciljanih zglavkara/ insekata treba poštovati zone bezbednosti od 20 m do vodene površine.

VREME PRIMENE: Posle setve, a pre nicanja kukuruza do faze 3 lista (00-13 BBCH skale).

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: Jednom, na toku površni u toku vegetacije.

TRETIRANJE IZ VAZDUHOPILOVA Nije dozvoljeno.

NAČIN PRIMENE: Traktorskim ili leđnim prskalicama uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

MOGUĆNOST MEŠANJA: Radi proširenja spektra delovanja, preparat se može mešati sa proizvodima na bazi mezontriona. Pre upotrebe obavezno proveriti kompatibilnost preparata.
FITOTOKSIČNOST: Vendeta može biti fitotoksična za brojne useve, stoga je neophodno sprečiti zaošanje.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe): Obezbeđena vremenom primene preparata.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju): Šest časova.

OSTALA OGRANIČENJA: Preparat zbog ispriljivosti ne primenjivati na zemljištima sa manje od 1% humusa.

PRIPREMA PREPARATA ZA PRIMENU: Potrebnu količinu preparata sipati u rezervoar prskalice, prethodno do polovine napunjenom vodom, zatim dopuniti rezervoar vodom i dobro promešati.
Upotreba sredstava za zaštitu bilja dozvoljena je isključivo sertifikovanim profesionalnim korisnicima.

SIMPTOMI TROVANJA I MERE PRVE POMOĆI I LEČENJA:

Trovanja su retka, sem ako se radi o visokim dozama. Nakon ingestije se javljaju bolovi u trbuhu, povraćanje, dijareja, a kod teških trovanja i fascikulacije mišića, ubrzano disanje, ataksija i konvulzije. U daljem toku, kod teških trovanja, moguća su i oštećenja jetre i bubrega. Kod izloženosti preparatu (oralnim putem) može se očekivati pojava mučnine, povraćanja, dijareje, bolova u trbuhu, a kod teških trovanja i fascikulacije mišića, ubrzano disanje, ataksija i konvulzije. U daljem toku, kod teških trovanja, moguća su i oštećenja jetre i bubrega. U kontaktu sa kožom i sluznicom očiju mogu dati blage znake iritacije.

UPUTSTVO ZA PRAVILNO SKLADIŠTENJE:

Preparat treba skladištiti u originalnoj ambalaži, na suvom, hladnom i dobro ventiliranom mestu, na sobnoj temperaturi. Na taj način se može čuvati do dve godine. Čuvati pod ključem u dobro zatvorenom kontejnerima. Pri tome treba izbegavati kontakt sa jakim kiselinama, bazama i oksidirajućim agensima.



VENDETA

SELEKTIVNI TRANSLOKACIONI HERBICID NA BAZI TERBUTILAZINA
U OBLIKU KONCENTROVANE SUSPENZIJE SC

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU I PRATEĆE UPUTSTVO.

PRIDRŽAVATI SE UPUTSTVA ZA UPOTREBU DA BI SE IZBEGLI RIZICI PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU.

U promet se stavlja u obliku koncentrovane suspenzije - SC.

Sastav preparata:

Aktivna supstanca: — Terbutilazin

Generički naziv: — Terbutilazin

Hemijski naziv (IUPAC): — N2-terc-butil-6-hloro-N4-etil-1,3,5-triazin-2,4-dijamini

Sadržaj: — 500,0 ± 25,0 g/l terbutilazina

Tehnička čistoća: — min. 95%

CAS br: — 5915-41-3

EC br: — 227-637-9

HRAC

Terbutilazin 5 (C1)

PRIMENA: Vendeta je selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

U količini od 1,5 l/ha dobro suzbija: štir bljutavi (*Amaranthus blitoides*), vijušac (*Bilderdykia convolvulus*), tarčuzak (*Capsella bursa – pastoris*), lubeničarka (*Hibiscus trionum*), gorušica (*Sinapis arvensis*), čistac (*Stachys annua*).

U količini od 1,5 l/ha zadovoljavajuće suzbija: štir obični (*Amaranthus retroflexus*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*).

U količini 2,5 l/ha dobro suzbija: štir obični (*Amaranthus retroflexus*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*).

U količini 2,5 l/ha zadovoljavajuće suzbija: čičak (*Xanthium strumarium*).

U količini 2,5 l/ha slabo suzbija: divlji sirak (*Sorghum halepense*).



Skladištiti na ambijentalnoj temperaturi, u zatvorenom, originalnom kontejneru, na suvom, hladnom, dobro ventiliranom mestu, zaštićen od direktnog uticaja sunčeve svetlosti. Mesto skladištenja mora biti zaštićeno od pristupa dece, neovlašćenih osoba i životinja. Na mestu na kome se skladišti ne smeju se čuvati hrana, stočna hrana, đubriva ili semenska roba. Pri radu sa ovim proizvodom (naročito u slučajevima kada je prosut), neophodno je nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, obuću, zaštitne naočari, kao i zaštitu za disajne organe.

NAPOMENA: Pošto je skladištenje i primena van našeg uticaja, ne snosimo rizik nepravilnog skladištenja i primene.

NAČIN ISPIRANJA AMBALAŽE:

Ispiranju ambalažu od sredstva za zaštitu bilja potrebno je isprati odmah nakon pražnjenja, kako se sredstvo za zaštitu bilja ne bi osušilo u unutrašnjosti ambalaže.

Tehnost od ispiranja (ispirak) ambalaže sipa se u rezervoar uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i koristi za pripremanje rastvora za tretiranje.

Ispiranje ambalaža ispira se korišćenjem postupka trostrukog ispiranja ili postupka ispiranja pod pritiskom.

Postupak trostrukog ispiranja vrši se na sledeći način: sadržaj ambalaže se isprazni u rezervoar prskalice i ostavi da se ocedi 30 sekundi; doda se voda do 1/3 zapremine ambalaže; ambalaža se zatvori i sadržaj snažno promućka, tako da voda dođe do svih unutrašnjih površina; zatvaraj ambalaže se skine i pusti se da voda kojom je izvršeno ispiranje iscuri u rezervoar uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i ambalaža se ostavi 30 sekundi da se ocedi. Postupak se ponovi još dva puta i svaki put pri ponavljanju postupka ispiranja koristi čista voda, a zatim se isprana ambalaža probuša na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Ispiranje ispraznjene ambalaže postupkom pod pritiskom vrši se korišćenjem specijalnog raspršivača koji se nalazi na uređajima za primenu sredstava za zaštitu bilja i vrši se na sledeći način: dno ili bočni zid ambalaže se probuši i na to mesto se pričvrsti specijalni raspršivač - dizna uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja; kroz specijalni raspršivač - diznu propušta se voda u trajanju od oko 30 sekundi; po završenom ispiranju, ambalaža se ostavlja da se ocedi i osuši, probuši se na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Postupak čišćenja uređaja za primenu: Potpuno isprazniti rezervoar uređaja za primenu na tretiranju površini; Rezervoar napuniti vodom i isprazniti čitav sistem. Ravstaviti i očistiti dizne, filtere i ostalo. Uredaj za primenu treba očistiti i isprati na površini na kojoj je tretman izvršen, dalje od izvora voda (bunari, jezera, vodotoci, izvišća voda).

POSTUPANJE SA OSTACIMA SZB I ISPRAZNJENOM AMBALAŽOM:

Nakon upotrebe, korisnik sredstva za zaštitu bilja ne sme ponovo koristiti ispraznjenu ambalažu u bilo koje svrhe, već se prazna ambalaža mora zbrinuti na propisan način. Ostaci pesticida se uklanjaju sa ambalaže do nivoa 0,1% kako bi se ambalaža učinila neopasnom. Korisnik SZB ispranu ambalažu odlaze u posebne kese i dostavlja distributeru od koga je sredstvo kupljeno.

UPUTSTVO O POSTUPANJU U SLUČAJEVIMA ISPUŠTANJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U ŽIVOTNU SREDINU:

Prosuti preparat uz korišćenje lične zaštitne opreme treba okružiti i upiti inertnim, nezapaljivim materijalima kao što su pesak, zemlja ili specijalni upijači za hemikalije. Nakon što je prosuti preparat upijen, prikupiti sadržaj i odložiti ga u specijalne, za to pripremljene posude. U slučaju izlivanja velikih količina kontaminiranu površinu je neophodno odmah oprati 5% rastvorom amonijaka. Neophodno je obavestiti predstavnike lokalnih vlasti.

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROMUČKATI BOCU.

ROK UPOTREBE: 2 godine ako se pravilno skladišti

Pakovanje: 1 L

DATUM PROIZVODNJE I BROJ ŠARŽE UTISNUT NA AMBALAŽI.

Broj rešenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 321-01-922/2023-11 od 04.07.2024

Proizvodi i pakuje: Hemijska Industrija ZUPA d.o.o., Kruševac Srbija, Šandora Petešija bb, tel: 037/424-476, e-mail: office@hizupa.rs

ZASTUPNIK I DISTRIBUTER ZA BOSNU I HERCEGOVINU:

NOVOPIROM d.o.o. Modriča, Majevička 4, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, tel: +387 53 820-681

RUŠENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE: 12.03.3-330-4067/24 od 30.12.2024.



1L